

经皮瘤内注射无水乙醇治疗肝癌的术后护理

陈巧玲 曾国斌

我院自 1997 年始行经皮瘤内注射无水乙醇治疗肝癌共 23 例,其护理要点如下。

(一)术后严密观察病人 术后 1~2h 内注意病人的体温、脉搏、呼吸、血压、神志、皮肤颜色的变化,发现异常及时向医生报告作相应的处理。

(二)术后心理护理 术前向病人讲明介入治疗后可能出现的并发症,需配合的要点,鼓励病人树立战胜疾病的信心,解除病人紧张情绪,使病人消除顾虑,积极配合治疗。

(三)术后疼痛的护理 无水乙醇注入疗法多见一过性疼痛,我科所作病人粗略统计,发生率为 50%,主要是乙醇沿针道溢出刺激腹膜所致,另外尚未穿中肿瘤便开始注入乙醇或注入乙醇过多流入肝组织也可引起疼痛。术后平卧 1~2h 或穿刺点向上侧卧,尽量少搬动病人,可减轻疼痛,疼痛甚者可肌

肉注射镇痛定 60mg 或杜冷丁 50~100mg。

(四)术后注意保暖 乙醇有扩张血管的作用,注射后病人有面红、发热、出汗等表现,天冷时要注意保暖,防止受凉。

(五)术后注意安全 乙醇注射后,有些病人有醉酒的表现如:头晕、面红、发热、出汗等,术后用平车护送至病房,注意休息,防止发生意外。


(六)术后饮食护理 术后鼓励病人多饮水,增加尿量,促进排泄,减轻醉酒的症状,鼓励病人多进食高蛋白、高维生素,易消化的食物,增加营养,提高机体免疫力。

(七)其它 其它可能出现的并发症有一过性轻微肝功能异常,腹腔内出血、胆道损伤、感染等,术后应加强观察,及时发现及时根据病情作相应的处理,减轻病人痛苦。

(收稿日期 2000-11-09)

作者单位 514031 广东省梅州市人民医院放射科

经皮瘤内注射无水乙醇治疗肝癌的术后护理

作者: [陈巧玲](#), [曾国斌](#)
作者单位: [广东省梅州市人民医院放射科](#)
刊名: [介入放射学杂志](#) 
英文刊名: [JOURNAL OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY](#)
年, 卷(期): 2001, 10(4)
被引用次数: 1次

引证文献(1条)

1. [徐秀琴](#), [马晓瑞](#) [经皮肝穿刺瘤内注射无水乙醇\(PEI\)治疗肝癌的护理](#)[期刊论文]-[中国医学杂志](#) 2005(12)

本文链接: http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_jrfsxzz200104022.aspx

授权使用: qkahy(qkahy), 授权号: d0035203-1e5a-44bb-9f27-9e38014f74a3

下载时间: 2010年11月24日